

# CARTE D'IDENTIFICATION OXYBATE DE SODIUM

*Pour tout renseignement,  
contactez le service d'information médicale  
du laboratoire titulaire.*



## INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ POUR LE PATIENT ET LES PARENTS D'UN ENFANT TRAITÉ PAR OXYBATE DE SODIUM

### À FAIRE

- ▶ Gardez cette carte avec vous en permanence
- ▶ Montrez cette carte à tout médecin et pharmacien impliqués dans votre traitement
- ▶ Ayez une liste de tous les médicaments que vous prenez lorsque vous consultez votre médecin ou pharmacien
- ▶ Si vous présentez des symptômes inhabituels, comme des hallucinations, un discours incohérent, un comportement agité et confus (psychose) ou des pensées de commettre des actes violents (y compris atteinte à autrui) pendant votre traitement par oxybate de sodium, informez immédiatement votre médecin
- ▶ Gardez votre flacon d'oxybate de sodium hors de la vue et de la portée des enfants

### À NE PAS FAIRE

- ▶ **Ne prenez pas** d'alcool pendant que vous êtes traité par oxybate de sodium
- ▶ **Ne prenez pas** plus que la dose prescrite par votre médecin
- ▶ **Ne conduisez pas** et n'utilisez pas de machines dans les 6 heures suivant la prise d'oxybate de sodium
- ▶ **Ne prenez pas** d'autres médicaments avant d'en avoir discuté avec votre médecin
- ▶ **Ne donnez jamais** d'oxybate de sodium à quelqu'un d'autre

**L'oxybate de sodium peut provoquer une dépression respiratoire et une diminution du niveau de conscience**

## COORDONNÉES DU MÉDECIN TRAITANT

Nom : .....

Téléphone :

### Assistance médicale d'urgence

Téléphone :

Je soussigné(e) Dr ..... certifie que

M/Mme/Melle ..... est porteur(se) d'une maladie  
relevant d'un traitement par l'oxybate de sodium

Fait le : ..... Signature :

## INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ POUR LES MÉDECINS / PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Ce patient est traité par oxybate de sodium pour le traitement de la narcolepsie avec cataplexie. L'oxybate de sodium peut provoquer une dépression respiratoire et du système nerveux central, des convulsions, des épisodes psychotiques, une dépression et un comportement suicidaire. Les opioïdes et les barbituriques ne doivent pas être utilisés avec de l'oxybate de sodium. Les autres dépresseurs respiratoires et du système nerveux central doivent être évités.

Soyez particulièrement vigilant en cas d'association d'oxybate de sodium avec le topiramate et le valproate. L'oxybate de sodium présente un risque potentiel d'abus, de mésusage et de dépendance.

Référez-vous au RCP de l'oxybate de sodium avant de prescrire ou de délivrer d'autres médicaments pour ce patient.