


Guide pour
le bon usage de

RYSTIGGO® ▼
(rozanolixizumab)

140 mg/mL, solution injectable



GUIDE PATIENT

FR-RZ-2500063 - diffusé sous autorité de l'ANSM

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité

Ce document doit être remis au patient lors de la prescription de RYSTIGGO®.

Veuillez également consulter la notice de RYSTIGGO® contenue dans la boîte du médicament.




Inspired by **patients**.
Driven by **science**.

*Inspirés par les **patients**. Guidés par la **science**.*

Sommaire

INTRODUCTION	p. 3
COMMENT INJECTER RYSTIGGO®	p. 4
COMMENT CONSERVER RYSTIGGO®	p. 23
COMMENT ÉLIMINER LES DÉCHETS	p. 24
GESTION DES CYCLES DE TRAITEMENT	p. 26
PLANIFIEZ VOS PERFUSIONS	p. 28
VOS CONTACTS UTILES	p. 30



Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé : <https://signalement.social-sante.gouv.fr>

Pour plus d'information, consulter la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site Internet de l'ANSM : <https://ansm.sante.fr/documents/referance/declarer-un-effet-indesirable>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Introduction

Votre médecin vous a prescrit RYSTIGGO®, en association avec un traitement standard, dans le cadre du traitement d'une maladie appelée « myasthénie auto-immune généralisée », une maladie qui provoque une faiblesse musculaire.¹

RYSTIGGO® peut être administré :

- à l'hôpital ou à domicile par un professionnel de santé,
- en auto-injection à domicile par le patient ou un aidant, après formation.

Ce guide contient des informations importantes sur votre traitement par RYSTIGGO® : son administration en auto-injection, ses conditions de conservation et les cycles de traitement. Conservez-le précieusement afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

N'hésitez pas à poser toutes les questions nécessaires à votre médecin concernant votre traitement ou votre maladie.

Pour plus d'informations sur RYSTIGGO®, veuillez lire attentivement la notice contenue dans la boîte du médicament et disponible sur la **base de données publique des médicaments** :

<https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/medicament/68822785/extrait#tab-rdp-et-notice>

ou en flashant ce QR code :



Comment injecter RYSTIGGO® ?



Qu'est-ce qu'une perfusion sous-cutanée ?

- RYSTIGGO® vous sera administré par un médecin ou un/e infirmier/ère.¹
- Vous pourrez également vous injecter vous-même RYSTIGGO®.
- Vous et votre médecin ou infirmier/ère déciderez si, après une formation par un professionnel de santé, vous pouvez vous injecter vous-même ce médicament. Une autre personne pourra également effectuer vos injections après avoir été formée.
- Ne vous administrez pas RYSTIGGO® ou ne l'administrez pas à quelqu'un d'autre avant d'avoir été formé pour le faire.
- L'administration du 1^{er} cycle et de la 1^{ère} injection du 2^{ème} cycle doit être réalisée en milieu hospitalier.¹

De manière générale, une perfusion correspond à l'injection lente et régulière d'un produit médicamenteux dans le corps.²

Dans le cas de RYSTIGGO® il s'agit d'une **perfusion sous-cutanée**.¹ L'aiguille n'est pas introduite dans une veine mais sous la peau, dans le tissu sous-cutané.



RYSTIGGO® est généralement injecté dans la partie inférieure du ventre, sous le nombril. Les injections ne doivent pas être faites dans les zones où la peau est sensible, rouge ou dure, ou présente des ecchymoses.¹

- Prévoyez le temps nécessaire pour réaliser votre injection.
- Installez-vous dans une pièce où vous ne serez pas dérangé(e) et qui est équipée d'une surface de travail plane, propre et bien éclairée.
- Retirez du réfrigérateur le nombre de flacons nécessaires à l'injection.¹
- Conservez RYSTIGGO® dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière.¹
- Pour une perfusion plus confortable, laissez le flacon atteindre la température ambiante avant d'utiliser ce médicament. Cela peut prendre 30 minutes à 2 heures. Ne pas réchauffer d'une autre manière.¹
- Rassemblez tout le matériel dont vous aurez besoin sur votre surface de travail.

Les 4 chapitres de l'injection

CHAPITRE 1 Préparez-vous	p. 7
CHAPITRE 2 Préparez le ou les flacon(s) et la seringue	p. 10
CHAPITRE 3 Préparez la perfusion	p. 18
CHAPITRE 4 Perfusez et terminez	p. 22

CHAPITRE 1.

Préparez-vous



Étape 1 | Rassemblez tout le matériel dont vous aurez besoin sur une surface de travail plane et propre

Vous trouverez ici le matériel nécessaire à l'administration d'une perfusion sous-cutanée de RYSTIGGO® par poussée manuelle (c'est-à-dire sans pousse seringue)¹. Consultez la notice avant l'injection et contactez votre professionnel de santé pour toute question.

**Dans l'emballage
de RYSTIGGO®**



• **Le(s) flacon(s)
de RYSTIGGO®**

Autres éléments (non inclus dans la boîte de RYSTIGGO®)



- **Seringue** : 5 ml ou 10 ml, selon la dose qui vous a été prescrite.



- **Aiguille de transfert** : diamètre 18 gauge ou supérieur. 18 gauge fait référence à la mesure du diamètre de l'aiguille. Attention : plus le chiffre est élevé, plus l'aiguille est fine.




- **Ligne de perfusion** : elle est munie d'une aiguille de calibre 26 gauge ou de plus grand diamètre. La longueur de la ligne de perfusion mesure au maximum 61 cm.



- **Lingettes imbibées d'alcool** : pour la désinfection.




- **Bol ou papier absorbant** pour recueillir le liquide excédentaire lors du remplissage de la ligne de perfusion (cf. Chapitre 3. Préparez la perfusion).



- **Ruban adhésif ou pansement transparent** : pour fixer l'aiguille et la ligne de perfusion à la peau.



- **Pansement adhésif** : pour recouvrir le site de perfusion après l'administration.



- **Récipient pour objets tranchants** : pour jeter tous les éléments contenant le produit restant, c'est-à-dire les flacons partiellement utilisés, le kit de perfusion ainsi que tout le matériel d'administration.

*Le matériel ci-dessus est fourni à titre indicatif uniquement.
Votre matériel spécifique peut avoir un aspect différent.*

**Vérifiez la dose prescrite par votre médecin,
vous avez peut être besoin de plus d'un flacon.¹**



Étape 2 | Nettoyez votre surface de travail et vos mains

- Nettoyez votre surface de travail avec un désinfectant.¹
- Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon ou utilisez un désinfectant pour les mains.¹
- Séchez vos mains avec une serviette propre.¹




À l'exception de la lingette imbibée d'alcool, il peut être utile d'ouvrir les emballages du matériel, y compris celui des pansements adhésifs, dès cette étape.

Vous pouvez jeter les emballages ou le matériel non tranchant avec vos déchets ménagers selon les consignes de tri locales, plutôt que dans le récipient pour objets tranchants.

CHAPITRE 2.

Préparez le ou les flacon(s) et la seringue

Préparez le(s) flacon(s)




- **Utilisez chaque flacon une seule fois.**
- **N'utilisez pas RYSTIGGO® si la date de péremption est dépassée.**¹ La date de péremption est inscrite sur l'étiquette du flacon et sur la boîte.
- **Avant d'utiliser RYSTIGGO®, vérifiez si la dose sur la ou les boîte(s) est identique à la dose prescrite.** Ne pas utiliser si la dose n'est pas identique à celle prescrite. Contactez votre médecin ou votre infirmier/ère pour connaître la marche à suivre.¹
- **N'utilisez pas le flacon si vous remarquez que le liquide semble trouble, contient des particules étrangères ou a changé de couleur.** La solution doit être incolore à jaune/brunâtre pâle, limpide à légèrement opalescente (blanc nacré).¹
- **Ne secouez pas** le flacon.¹
- **N'utilisez pas le flacon si le capuchon protecteur est manquant ou cassé.** Si l'un des flacons est brisé ou n'a pas de capuchon, signalez-le et retournez-le à la pharmacie.¹



Contactez votre pharmacie pour tout problème lié à votre flacon.


Étape 3 | Retirez le capuchon protecteur du ou des flacon(s)

- **Retirez le capuchon protecteur** du ou des flacon(s) en maintenant le bord (i) et en le soulevant (ii)¹




- **NE RETIREZ PAS le bouchon en caoutchouc.** Nettoyez-le avec une lingette imbibée d'alcool. Laissez sécher à l'air libre.¹
- **Laissez la capsule en aluminium en place.**¹
- **Vérifiez votre dose :** si vous avez besoin de plus d'un flacon pour préparer la dose prescrite, retirez tous les capuchons et nettoyez les bouchons.¹

Prélevez le médicament dans la seringue



Étape 4 | Fixez l'aiguille de transfert à la seringue


- Retirez uniquement le capuchon en plastique de la seringue (pas de l'aiguille). Ne touchez pas l'extrémité de la seringue pour éviter les germes.




- Avec le capuchon de l'aiguille toujours en place, poussez doucement ou vissez l'aiguille de transfert sur la seringue jusqu'à ce qu'elle soit fermement fixée (i).¹

Étape 5 | Aspirez de l'air dans la seringue

- Tirez lentement le piston de la seringue pour aspirer de l'air dans la seringue.¹
- Remplissez la seringue avec environ la même quantité d'air que la quantité de médicament contenue dans le flacon (ii).¹
- Gardez le capuchon de l'aiguille en place pendant cette étape.¹



Étape 6 | Retirez le capuchon de l'aiguille de transfert




- Tenez la seringue d'une main. De l'autre main, tenez le capuchon de l'aiguille de transfert et enlevez-le en tirant bien droit (iii).¹
- Placez le capuchon sur la table pour le jeter plus tard.¹



Ne touchez pas l'extrémité de l'aiguille. Ne laissez pas l'extrémité de l'aiguille entrer en contact avec quoi que ce soit après avoir retiré le capuchon.


Étape 7 | Insérez l'aiguille de transfert dans le flacon



- Placez le flacon sur la table.¹
- Insérez l'aiguille de transfert tout droit à travers le bouchon en caoutchouc (iv).¹


Étape 8 | Retournez le flacon et la seringue

- Retournez le flacon et la seringue vers le bas en conservant l'aiguille de transfert à l'intérieur du flacon (v).¹




Étape 9 | Poussez l'air de la seringue dans le flacon

- Vérifiez que l'aiguille de transfert pointe maintenant vers le haut et assurez-vous que la pointe de l'aiguille se trouve dans l'espace situé au-dessus du médicament.¹
- Poussez lentement le piston de la seringue vers le haut pour pousser tout l'air de la seringue dans le flacon (i).¹
- Gardez le pouce appuyé sur le piston de la seringue tout du long, afin de ne pas laisser entrer de l'air dans la seringue.¹
- Maintenez la pointe de l'aiguille dans l'espace situé au-dessus du médicament tout le temps. **N'introduisez pas d'air** dans le médicament, car des bulles pourraient se former.¹



Remplir la seringue peut être un peu délicat. Essayez de poser vos coudes sur une table pour stabiliser vos mains. Tenez le flacon entre le pouce et l'index, et la seringue comme indiqué sur les illustrations ci-dessous.


Étape 10 | Préparez-vous à remplir la seringue




- Maintenez votre pouce enfoncé sur le piston de la seringue. De l'autre main, tirez **lentement et délicatement** le flacon vers le haut afin que l'extrémité de l'aiguille soit entièrement recouverte par la solution médicamenteuse (ii).¹

Étape 11 | Remplissez la seringue avec autant de médicament que possible

- Maintenant, tirez lentement le piston de la seringue vers le bas et remplissez la seringue de médicament (iii).¹
- Continuez à tirer lentement et délicatement le flacon vers le haut pour que l'extrémité de l'aiguille soit entièrement recouverte par le liquide.¹
- Ajustez la pointe de l'aiguille pour maintenir dans le liquide. Cela vous aidera à prélever autant de médicament que possible du ou des flacon(s).¹
- Vous devez maintenant avoir dans la seringue un volume de médicament plus grand que la dose prescrite. Vous l'ajusterez ultérieurement.¹
- **Il y aura également une très petite quantité de médicament que vous ne pourrez pas retirer du flacon. Vous la jetterez avec le flacon plus tard.**¹




Étape 12 | Éliminez l'air de la seringue



- S'il y a un espace entre le liquide contenu dans la seringue et le haut de la seringue, poussez lentement le piston pour repousser l'air dans le flacon (iv).¹


- Si vous voyez des bulles d'air dans la seringue, vous pouvez les retirer en tapotant doucement sur la seringue avec votre index. Poussez ensuite lentement le piston pour repousser l'air dans le flacon (v).¹




Essayez de ne pas injecter d'air directement dans le médicament, car cela peut former des bulles d'air. Injectez plutôt l'air dans l'espace au-dessus du liquide. Les bulles d'air peuvent fausser la dose injectée et provoquer une sensation de picotement lorsque le liquide pénètre dans le corps.

Étape 13 | Retirez l'aiguille de transfert du flacon et de la seringue

- Retournez le flacon et la seringue et placez le flacon sur la surface de travail.¹
- Retirez l'aiguille de transfert et la seringue du flacon en tirant la seringue vers le haut (i).¹



À partir de maintenant et jusqu'à l'étape de purge, ne mettez pas votre pouce sur le piston de la seringue. Cela évite toute pression accidentelle et toute perte de médicament avant que vous ne soyez prêt(e) pour la perfusion.



- Retirez l'aiguille de transfert de la seringue en tirant ou en tournant délicatement la base de l'aiguille.¹
- **Ne touchez pas** l'aiguille.
Ne remettez pas le capuchon de l'aiguille en place.¹
- Jetez l'aiguille dans le récipient pour objets tranchants (ii).¹



En remettant le capuchon sur l'aiguille vous risquez de vous piquer. Il est plus sûr de jeter l'aiguille et le capuchon séparément dans le récipient pour objets tranchants.


Étape 14 | Vérifiez à nouveau votre dose

- Si vous avez besoin d'un autre flacon pour atteindre la dose prescrite, répétez les étapes précédentes (étapes 4 à 13) en utilisant la même seringue et une nouvelle aiguille de transfert pour éviter toute contamination.¹

CHAPITRE 3.



Préparez la perfusion

Étape 15 | Fixez la ligne de perfusion sur la seringue



- Placez la seringue sur la surface de travail propre pendant que vous préparez la ligne de perfusion.¹
- Retirez la ligne de perfusion de la pochette de protection.¹
- Retirez le capuchon de l'extrémité de la ligne de perfusion en le tournant (i).¹

- Placez le capuchon sur la surface de travail pour le jeter plus tard.
- Fixez la ligne de perfusion sur la seringue (ii) jusqu'à ce qu'elle soit fermement connectée (iii).¹



- **Ne retirez pas** le capuchon de l'aiguille de la ligne de perfusion.¹




Ne touchez pas l'embout de la seringue ou la base de la ligne de perfusion pour éviter les germes.¹

Étape 16 | Remplissez la ligne de perfusion avec le médicament

Cette étape permet d'empêcher l'air de pénétrer dans votre corps via le set de perfusion et garantit que vous recevez la bonne dose de médicament.

- Assurez-vous d'avoir un bol ou du papier absorbant devant vous : vous pouvez l'utiliser pour récupérer tout médicament en excès provenant de la ligne de perfusion.¹
- Gardez le capuchon sur l'aiguille de la ligne de perfusion et tenez-la au-dessus du bol ou du papier absorbant.
- Maintenant, tenez la seringue en position verticale et remplissez la ligne de perfusion de médicament en poussant doucement sur le piston de la seringue (i).¹
- **La quantité de liquide restante dans la seringue doit correspondre à la dose prescrite.**¹




Appuyez doucement sur le piston jusqu'à ce que le joint en caoutchouc soit aligné avec le trait noir indiquant votre dose sur la seringue.




Si le set de perfusion n'est pas conçu pour être rempli manuellement, suivez les instructions du fabricant et les conseils de votre équipe soignante pour la préparation.

Étape 17 | Choisissez et préparez le site de perfusion



- Sélectionnez une zone pour la perfusion sur la partie inférieure droite ou gauche de l'abdomen, sous le nombril (i).¹

- Ne perfusez jamais dans des zones où la peau est sensible, rouge ou dure ou présente des ecchymoses, dans des cicatrices ou des vergetures.¹




- Nettoyez la zone de perfusion avec une lingette imbibée d'alcool et laissez-la sécher à l'air libre (ii).¹

N'utilisez pas de mouchoir, de torchon ou de tout autre linge pour sécher votre peau après l'avoir nettoyée. Cela risquerait de contaminer la zone où l'aiguille doit être insérée.

Étape 18 | Insérez l'aiguille de la ligne de perfusion

- Retirez avec précaution le capuchon de l'aiguille de la ligne de perfusion.¹
- Pliez les ailettes ensemble et tenez-les avec le pouce et l'index d'une main.¹

- Avec l'autre main, pincez la peau entre 2 doigts pour former un pli.¹



- Poussez l'aiguille dans le milieu du pli et poussez-la sous la peau (i).¹

- L'aiguille doit pénétrer facilement. Si cela est difficile, vous pouvez tirer l'aiguille légèrement.¹


- Une fois l'aiguille correctement placée, vous pouvez arrêter de pincer la peau.

- Vous pouvez utiliser une ligne de perfusion sans aiguille à ailettes à l'extrémité. Votre infirmier/ère ou votre médecin vous expliquera comment insérer l'aiguille.¹

Étape 19 | Fixez l'aiguille de la ligne de perfusion

- Utilisez un pansement transparent pour maintenir l'aiguille en place (ii).¹

- Certains sets de perfusion ont un adhésif intégré.¹



- Vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour maintenir la ligne de perfusion sur votre peau.¹

CHAPITRE 4.

Perfusez et terminez

Étape 20 | Démarrez la perfusion

Voici l'explication pour l'auto-injection (poussée manuelle)

- Asseyez-vous confortablement.¹
- Appuyez fermement sur le piston de la seringue pour perfuser le médicament.¹
- Vous devez perfuser le médicament à une vitesse qui vous convient. Continuez à pousser jusqu'à ce qu'il ne reste plus de médicament dans la seringue.¹
- Avant et pendant la perfusion, assurez-vous que la ligne de perfusion n'est pas tordue ou pliée. Si cela se produit, l'écoulement du médicament peut être interrompu. Dans ce cas, corrigez la courbure de la ligne de perfusion et réessayez.¹
- Si vous ressentez une gêne ou en cas de reflux du médicament dans la ligne de perfusion, vous pouvez pousser plus lentement.¹



Une petite quantité de médicament restera dans la ligne de perfusion. Cela est normal et vous pouvez la jeter dans le récipient pour objets tranchants.¹

Étape 21 | Terminez la perfusion et nettoyez


- Une fois la perfusion terminée, **n'essayez pas** de retirer le pansement de l'aiguille. Retirez-les tous les deux de votre peau ensemble et jetez-les avec la seringue dans le récipient pour objets tranchants.¹



Une ou deux gouttes de liquide peuvent être présentes au niveau du site de perfusion après le retrait de l'aiguille. Cela est normal.¹

Jetez le matériel utilisé

- Jetez le ou les flacon(s) utilisé(s) et le médicament restant dans le récipient pour objets tranchants (i).¹
- Jetez toutes les autres fournitures usagées dans vos ordures ménagères.¹



Protégez le point d'injection

- Recouvrez le site de perfusion avec un pansement propre, comme un pansement adhésif.¹

Rangez le collecteur en tout sécurité

- **Gardez toujours le récipient pour objets tranchants hors de la vue et de la portée des enfants.**¹

Comment conserver RYSTIGGO® ?



- RYSTIGGO® doit être conservé à l'abri de la lumière, dans son emballage extérieur, au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C).¹ RYSTIGGO® peut également être conservé à une température ambiante (maximum 25°C) pendant une durée maximale de 20 jours.¹
- Ne congelez pas RYSTIGGO®.¹
- Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.¹
- N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette du flacon et l'emballage extérieur après EXP.¹

Comment éliminer les déchets?



Dans le cas où vous vous auto-injectez le médicament RYSTIGGO®, vous êtes responsable de l'élimination de vos déchets. Chaque flacon est à usage unique. Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation locale.



Récipient pour objets tranchants

Vous devez y jeter :

- L'aiguille avec le pansement,
- La seringue usagée,
- Le ou les flacon(s) utilisé(s) et le médicament restant.



Ordures ménagères

Vous pouvez y jeter :

- Toutes les autres fournitures.




- Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères.
- Demandez à votre pharmacien si vous pouvez lui rapporter les médicaments que vous n'utilisez plus.
- Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

La gestion des déchets

Les récipients pour objets tranchants aussi appelés collecteurs DASRI (Déchets d'Activités de Soin à Risques Infectieux) sont disponibles gratuitement en pharmacie.

- Gardez-les toujours **hors de portée des enfants**.
- Lorsque le récipient pour objets tranchants est plein, vous devez **fermer définitivement la boîte** et la rapporter à **un point de collecte**.



Pour connaître les points de collecte les plus proches (ex : pharmacie, laboratoire d'analyse médicale), renseignez-vous auprès de votre pharmacien, de votre médecin, de votre mairie ou sur le site internet : <http://dastri.fr/nous-collectons>.

Les déchets contenus dans les récipients pour objets tranchants ne doivent en aucun cas être mélangés et jetés avec les ordures ménagères.

Gestion des cycles de traitement



RYSTIGGO® est administré une fois par semaine pendant 6 semaines.¹

La dose hebdomadaire totale recommandée de RYSTIGGO® est calculée en fonction de votre poids corporel par le médecin.



Si vous changez de poids, parlez-en à votre médecin

Vous recevrez un total de 6 doses de RYSTIGGO®, espacées d'une semaine. Cette période de 6 semaines est appelée un **cycle de traitement**.¹

1^{ER} CYCLE DE TRAITEMENT



PAUSE




2^{ÈME} CYCLE DE TRAITEMENT



ENTRE LES CYCLES :

- Surveillez vos symptômes
- Faites le point avec votre médecin
- Planifiez les prochaines étapes du traitement



Votre équipe soignante évaluera l'effet de votre traitement sur votre maladie. Elle pourra vous proposer de continuer avec RYSTIGGO®, d'ajuster la fréquence entre les cycles de traitement ou d'arrêter.

Planifiez vos perfusions



Vous pouvez utiliser les tableaux qui suivent pour renseigner les dates de vos perfusions de RYSTIGGO®.

Cochez (✓) pour chaque perfusion une fois qu'elle a eu lieu.

CYCLE 1	DATE	HEURE	✓
Semaine 1 ►			
Semaine 2 ►			
Semaine 3 ►			
Semaine 4 ►			
Semaine 5 ►			
Semaine 6 ►			

Que faire si vous oubliez ou manquez une perfusion de RYSTIGGO® ?

Si vous oubliez une dose de RYSTIGGO®, veuillez contacter immédiatement votre médecin pour obtenir des conseils et programmer une nouvelle injection de **RYSTIGGO® dans les 4 jours suivants**. Par la suite, la dose suivante doit être administrée conformément au schéma posologique initial jusqu'à la fin du cycle de traitement.¹



Pour vous aider à suivre les dates de vos perfusions, vous pouvez ajouter la date et l'heure de chaque injection dans le calendrier de votre téléphone et programmer des alertes.

À la suite d'un cycle de perfusions de RYSTIGGO®, votre équipe soignante évaluera votre réponse au traitement et décidera, avec votre accord, si vous avez besoin de cycles supplémentaires. La fréquence des cycles et la durée des pauses entre chaque cycle vous seront précisées.¹

Vous pouvez noter les prochaines dates où sont prévues vos perfusions de RYSTIGGO® dans les tableaux ci-dessous.

CYCLE 2	DATE	HEURE	✓
Semaine 1 ►			
Semaine 2 ►			
Semaine 3 ►			
Semaine 4 ►			
Semaine 5 ►			
Semaine 6 ►			

CYCLE 3	DATE	HEURE	✓
Semaine 1 ►			
Semaine 2 ►			
Semaine 3 ►			
Semaine 4 ►			
Semaine 5 ►			
Semaine 6 ►			

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, Vous pouvez également déclarer les effets indésirables des événements sanitaires indésirables du ministère

parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.
directement via le portail de signalement
chargé de la santé : <https://signalement.social-sante.gouv.fr>

Vos contacts utiles



Médecin traitant

Nom _____

Tél. _____



Médecin spécialiste

Nom _____

Tél. _____



Infirmier coordinateur/ Infirmière coordinatrice

Nom _____

Tél. _____



Autre professionnel de santé _____

Nom _____

Tél. _____



Autre professionnel de santé _____

Nom _____

Tél. _____

Pour toute question ou complément
d'information, n'hésitez pas à contacter
votre professionnel de santé

Références bibliographiques

1. Résumé des Caractéristiques du Produit RYSTIGGO®.
2. Dictionnaire médical de l'Académie de médecine, version 2024.
<https://www.academie-medecine.fr/le-dictionnaire/index.php?q=perfusion>
Site consulté le 10 avril 2025.

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement la prescription de votre médecin.

Pour plus d'informations, consultez la notice dans la boîte de votre traitement ou sur la **base de données publique des médicaments** :

<https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/medicament/68822785/extrait#tab-rcp-et-notice>

ou scanner ce QR code :

